



Ośrodek Rehabilitacji  
Ptaków Chronionych  
**PTASI AZYL**

# Pierwsza pomoc dzikim ptakom

Lek wet Agnieszka Czujkowska

Dr n. Wet Andrzej G. Kruszewicz

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie




Projekt współfinansuje



MIASTO  
STOŁECZNE  
WARSZAWA





Pierwsza pomoc to wszelkie czynności przed dostarczeniem ptaka do odpowiedniej placówki gdzie oceniony zostanie jego stan i podjęte zostaną dalsze działania.

# Pierwsza pomoc dzikim ptakom podzielić można na dwie części:

- \* pomoc medyczna tj. opatrzenie ran
- \* pomoc doraźna tj. karmienie i przetrzymywanie

**Każda interwencja powinna być  
zaplanowana !**

Zasada numer jeden to :  
bezpieczeństwo ludzi jest  
najważniejsze

# Zanim podejmiemy działania

- \* co to za gatunek i czy potrzebuje pomocy ?
- \* jak schwytamy zwierzę ? **czy potrzebne będą specjalne służby** ? czy ten ptak może być niebezpieczny ?
- \* gdzie przetransportujemy zwierzę ?
- \* jak przetransportujemy zwierze ? (rodzaj przewózki odpowiedni do czasu podróży i kondycji ptaka )

# Kiedy potrzebna jest pomoc ?

- \* ptak nie reaguje na otoczenie, siedzi nastroszony, często ma brudne pióra
- \* widoczne są rany, krew, wysięk
- \* nie widać ran ale ptak nie jest w stanie prawidłowo się poruszać, bardzo mocno kuleje, podczas prób lotu widać asymetrię skrzydeł
- \* zniszczone zostało gniazdo, ptaki dorosłe zginęły lub opuściły pisklęta
- \* nagie pisklęta leżące poza gniazdem
- \* ciała obce np. ptaki zaplątane w żyłkę, ptaki ze sznurkami oplątanymi wokół palców

# Kiedy potrzebna jest pomoc ?

- \* ptaki podejrzane o postrzał
- \* ptaki dziwnie zachowujące się i znalezione w pobliżu drogi podejrzane o kolizję z samochodem
- \* ptaki dziwnie zachowujące się znalezione pod przewodami elektrycznymi
- \* ptaki uwięzione w budynkach lub sieci wentylacyjnej
- \* w trakcie ostrych zim ptaki które nie są w stanie zdobyć pokarmu, wycieńczone, apatyczne, znajdowane poblizu osad ludzkich

# Najczęstsze ptasie interwencje

- \* Młode ptaki
- \* Złamania, zwichnięcia
- \* Poranienie przez koty
- \* Zatrucia, osłabienie i choroby pasożytnicze
- \* Urazy po uderzeniu w szybę lub budynek



# Niepotrzebne interwencje

- \* Młode sowy
- \* Młode pustułki
- \* Gałęziaki (drozdy, kawki)
- \* Bociany spóźniające się z odlotem

# „Sierotki”



# Problemy z krukowatymi







Adopcja kaczki krzyżówki

# Urazy po uderzeniu w szybę lub budynek

- \* Zaburzenia CUN
- \* Apatia
- \* Obrzęk jednej strony głowy „asymetryczny wygląd”
- \* Krwiak oka – uwaga u ptaków drapieżnych
- \* Krew w dziobie – krwotok wewnętrzny

# Młode pustułki

- \* Koczują na dachach gdzie są DOKARMIANE PRZEZ RODZICÓW
- \* Jeśli ptak nie jest ranny należy go odnieść na miejsce

# Jerzyki

- \* Młode wyskakują w trakcie upałów z gniazd ratując się przez przegrzaniem
- \* Trudny odchów – specyficzna technika karmienia i dieta
- \* Kryteria wypuszczenia na wolność ?
- \* Kiedy eutanazja ?



Porównanie młodego i dorosłego jerzyka





# Botulizm co roczny problem z ptactwem wodnym

- \* Masowe padnięcia
- \* Ptaki trafiające do lekarzy na ogół w bardzo kiepskim stanie
- \* Leczenie
  - \* Płukanie żołądka
  - \* Paranteralnie enrofloxacyna (nie dopuścić do rozpadnięcia bakterii)
  - \* Płyny
  - \* Węgiel
  - \* W ciężkim stanie steryd

# Problemy z bocianami

- \* Porażenia prądem
- \* Uszkodzenia obręczy barkowej
- \* Złamania kości skrzydeł
- \* Złamania kości nóg
- \* Urazy dzioba
- \* Niedorozwój młodych
- \* Bójki na gnieździe

# Chwytnie .....



# Transport.....



# Pierwsza pomoc

- \* bezpieczeństwo
- \* znajomość anatomii
- \* minimum stresu
- \* rozpoznanie gatunku
- \* stan ptaka – kondycja itp
- \* komfort termiczny
- \* pokarm, woda
- \* przetrzymywanie

# Opatrunki

- \* materiały
- \* wielkość ptaka
- \* transport
- \* Przetrzymanywanie
- \* miej wszystko przygotowane i pod ręką w momencie rozpoczynania zabiegu!

# Opatrunki

- \* kończyny ptaków bandażujemy w pozycji fizjologicznej
- \* nie jest zalecane bandażowanie ptaków mniejszych od gołębia – bez wprawy możemy wyrządzić więcej szkody niż pożytku
- \* małym ptakom lepiej ograniczyć ruch (np. wróbel, drozd)

# Ptaka krwawiący

- \* znajdź ranę
- \* obandażuj używając dużej ilości materiałów chłonnych
- \* zostaw ptaka w spokoju
- \* skonsultuj się z lekarzem weterynarii



# Ptaka wyziębiony

- \* powoli podnoś temperaturę. Zbyt szybkie ogrzanie może doprowadzić do zapaści krążeniowej.
- \* najpierw pojenie (podawaj tylko płyny izotoniczne)
- \* potem małe ilości lekkostrawnej, łatwo przyswajalnej karmy

# Ptaka nieprzytomny

- \* przenieś w bezpieczne miejsce
- \* zapewnij komfort termiczny
- \* obserwuj
- \* nie podawaj pokarmów ani wody na siłę

# Ptaka młody/pisklę nie znanego gatunku

- \* pisklę nie trawi jeśli nie ma zapewnionej odpowiedniej temperatury
- \* jeśli jest to ptak śpiewający bezpiecznie jest podać pokarm białkowy
- \* Nawet łuszczone padają swym młodym pokarm białkowy
- \* nie dozwolone: wędliny, przetworzony nabiał, larwy much, słodycze
- \* pisklę musi dostawać wodę

# Ptaka młody/pisklę nie znanego gatunku

- \* ptaki drapieżne i sowy: mięso i tłuczone kości, nie podajemy podrobów ani wędlin!
- \* ptaki drapieżne nie piją wody ponieważ pobierają ją z pokarmu
- \* młode kaczki powinny mieć duże naczynie z wodą
- \* pokarm: płatki owsiane, drobno posiekane zielonki, starta marchew i jabłko, ryż

# Ptak młody/pisklę nie znanego gatunku

- \* kuraki: drobno zmielone ziarno, trochę białka
- \* stale dostępna woda
- \* mogą nie żerować jeśli pokarm się nie rusza
- \* dzięcioły: pokarm białkowy i pojenie
- \* gołębie: przegotowane ziarno plus siemię lniane i płatki owsiane
- \* karmienie metodą piątkową

Dziękuję za uwagę

Powodzenia !